

ПОКАЗАНИЯ к LPG массажу :

LPG-массаж применяют не только для коррекции фигуры и лечения всех стадий целлюлита. Он также применяется в качестве реабилитации после различных травм для снятия болевого синдрома и признаков отечности, а также для решения следующих проблем:

- Ожирение - Локальные жировые отложения (жировые «подушки», полные руки, галифе, «тяжелые» бедра, полный живот)
- Обвисшая, дряблая, неэластичная кожа с низким тургором
- Неровный рельеф кожи с эффектом «апельсиновой» корки
- Послеродовые растяжки и отвисание кожи
- Отеки
- Мышечные спазмы
- Посттравматические изменения тканей (рубцы, послеоперационные шрамы, следы от ожогов)
- Восстановление после пластической операции
- Возрастные изменения кожи
- Гравитационный птоз
- Общая утомляемость организма
- Остеохондроз

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ к LPG массажу :

- Доброкачественные и злокачественные образования.
- Тромбоз, тромбофлебит.
- Варикозная болезнь.
- Патологии кровеносной системы и сосудов, склонность к кровотечениям.
- Мочекаменная болезнь.
- Почечная и сердечная недостаточность.
- Лихорадка, повышенная температура тела.
- Простуда, вирусные и бактериальные инфекции.
- Обострение хронических патологий.

- Язва (во время обострения).
- Нарушение целостного кожного покрова в месте проведения массажа.
- Воспалительные процессы в проблемной зоне или кожные заболевания.
- LPG массаж не осуществляется при беременности и грудном вскармливании, а также во время месячных. Не следует проводить процедуру при приеме медикаментов и витаминов, снижающих свертываемость крови.

Липомассаж принято относить к категории безопасных процедур, однако определенные **ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ** возникают и после его проведения. К ним относятся:

- Умеренная отечность (возникает из-за усиленного тока лимфы в межклеточное пространство).
- Слабовыраженный озноб (реакция на механическое раздражение).
- Синяки (объясняются индивидуальными особенностями пациента, повышенной чувствительностью кожи).

Все перечисленные негативные реакции не требуют лечения или наблюдения, самостоятельно проходят в течение 1 — 5 дней.